

ENDODONTISK INFEKTIONSPREVENTION BLAND ALLMÄNTANDLÄKARE I SVERIGE OCH NORGE, *Leona Malmberg, Ellen Hägg, Annika Björkner*, Malmö Universitet, Malmö, Sverige

Introduktion: European Society of Endodontology har formulerat riktlinjer för rotbehandling som definierar acceptabel vårdstandard inom endodonti. Studier har dock visat att många tandläkare inte följer dessa riktlinjer och vidtar bristfälliga infektionspreventiva åtgärder.

Målsättning: Syftet med denna studie var att undersöka rutinerna för infektionsprevention vid endodontisk behandling bland allmäntandläkare i Sverige och Norge. Material och metod: En enkät skickades till 1384 allmäntandläkare i Sverige och Norge med frågor om olika aspekter av infektionsprevention vid endodontisk behandling; bland annat användning av kofferdam, antibakteriella lösningar, handdesinfektion och handskar.

Resultat: Svarsfrekvensen var 61,4%. 96,9% använde rutinmässigt kofferdam vid rotbehandling. 88,3% tätade alltid eller ofta området mellan kofferdam och tand. De flesta desinficerade arbetsfältet, men vilka antibakteriella lösningarna som användes varierade. 11,9% använde inte alls handskar och 10,5% använde inte handdesinfektion under behandling.

Slutsatser: De flesta uppgav att de vidtog åtgärder för att etablera och upprätthålla aseptiken, vilket tyder på medvetenhet om vikten av infektionsprevention vid endodontisk behandling. Dock kan det finnas ett glapp mellan rapporterat och faktiskt beteende. Ytterligare studier behövs för att bedöma hur infektionspreventionen utförs i praktiken, inte minst vad gäller handhygien vid endodontisk behandling ute i allmäntandvården.